

# Ray-Grass italien + Trèfle incarnat



## Nom latin

Lolium multiflorum + Trifolium incarnatum

## Famille

Graminées + Légumineuses

## BCAE 8

Oui

## Densité\*

20 + 10 kg/ha

## PMG (poids de mille grains)

3 g / 4 g

## Coût

83 €/ha

\* Valable pour un semis avec un combiné rotative-semoir

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Avantages	Inconvénients
Fourrage de qualité	Risque de manque d'eau pour la culture suivante si la destruction est tardive
Semis tardif possible	Destruction difficile
Récolte de printemps possible	Sensible à la sécheresse
En BACE 8, la fauche est autorisée avant les 3 mois pour autant qu'au moins une des espèces repousse.	
Couvert non gélif	

## ASPECTS VÉGÉTATIFS

Facilité d'implantation	Couverture de sol	Piégeage de l'azote	Rendement	Résistance à la sécheresse	Restitution d'azote
Moyenne	Moyenne	Élevé	Moyen	Faible	Faible

Durée de l'interculture : **longue**

## ASPECTS AGRONOMIQUES

Valorisation fourragère	Lutte contre les adventices	Sensibilité aux maladies	Effet sur la structure	Enracinement	Appétence aux limaces
Fauche	Faible	Faible	Élevé	Fasciculé et pivotant	Moyenne

## DATE DE SEMIS

Si valorisation fourragère :

Période de récolte	Région	Date de semis	Région	Date de semis
Automne	Nord du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 15/08	Nord du sillon Sambre & Meuse Sud du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 30/09 du 1/06 au 30/09
	Sud du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 31/07		
Printemps	Nord du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 30/09	Sud du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 30/09
	Sud du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 30/09		

Si pas de valorisation fourragère :

## TECHNIQUE DE SEMIS

Technique de semis	Efficacité
À la volée	-
À la volée avec recouvrement/déchaumeur	+
Combiné rotative-semoir	++

## DESTRUCTION - EFFICACITÉ

Gel	Roulage en période de gel	Broyage	Labour	Déchaumage	Destruction chimique **
-	-	-	++	-*	+

\*++ si déchaumeur à disques - \*\* Interdite dès 2025 si couvert déclaré en « Eco-régime Couverture longue du sol »

## ADAPTATION À LA CULTURE SUIVANTE

Lin	Pomme de terre	Maïs	Betterave	Colza	Légumineuse (pois, féverole...)	Légume
Pas d'effet	Pas d'effet	Pas d'effet sauf si détruit tardivement *	Pas d'effet	Pas d'effet sauf si présence de sclérotés	Pas d'effet sauf si présence de sclérotés	Pas d'effet sauf si présence de sclérotés

\* (production de fourrage) pour la disponibilité en eau et en azote

## REMARQUES

- Le trèfle incarnat est sensible aux Sulfonylurées.
- Le trèfle incarnat peut être exploité à la fois en automne et au printemps à condition que la coupe soit réalisée avant la floraison.
- Dans le cas d'un précédent pauvre en azote et d'une récolte en fourrage, il est conseillé de fertiliser avec 60 unités d'azote efficace (organique ou minéral).

