

Seigle multicaule + Vesce commune d'hiver



Nom latin

Secale cereale + Vicia sativa

Famille

Graminées + Légumineuses

BCAE 8

Oui

Densité*

21 + 20 kg/ha

PMG (poids de mille grains)

15 g / 30 à 75 g

Coût

96 €/ha

* Valable pour un semis avec un combiné rotative-semoir

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Avantages	Inconvénients
Récolte de printemps possible	Coût du mélange
Semis tardif possible	Installation lente
Production de fourrage riche en protéines	Le seigle est appétant pour les limaces
En BCAE 8, la fauche est autorisée avant les 3 mois pour autant qu'au moins une des espèces repousse	Certaines variétés de vesce favorisent la multiplication de l'Aphanomyces

ASPECTS VÉGÉTATIFS

Facilité d'implantation	Couverture de sol	Piégeage de l'azote	Rendement	Résistance à la sécheresse	Restitution d'azote
Moyenne	Moyenne	Moyen	Moyen	Moyenne	Moyenne

Durée de l'interculture : **moyenne à longue**

ASPECTS AGRONOMIQUES

Valorisation fourragère	Lutte contre les adventices	Sensibilité aux maladies	Effet sur la structure	Enracinement	Appétence aux limaces
Fauche	Moyenne	Faible à élevée (selon la variété de vesce)	Moyen	Fasciculé et pivotant	Moyenne

DATE DE SEMIS

Si valorisation fourragère :

Si pas de valorisation fourragère :

Période de récolte	Région	Date de semis	Région	Date de semis
Automne	Nord du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 15/07	Nord du sillon Sambre & Meuse	1/06 au 31/10
	Sud du sillon Sambre & Meuse	du 1/06 au 15/07		
Printemps	Nord du sillon Sambre & Meuse	du 1/09 au 31/10	Sud du sillon Sambre & Meuse	1/06 au 15/10
	Sud du sillon Sambre & Meuse	du 1/09 au 15/10		

TECHNIQUE DE SEMIS

Technique de semis	Efficacité
À la volée	-
À la volée avec recouvrement/déchaumeur	+
Combiné rotative-semoir	++

DESTRUCTION - EFFICACITÉ

Gel	Roulage en période de gel	Broyage	Labour	Déchaumage	Destruction chimique **
-	-	-	++	+	+

*++ si déchaumeur à disques

** À partir de 2025 : destruction chimique interdite pour les couverts déclarés en « Eco-régime couverture longue du sol »

ADAPTATION À LA CULTURE SUIVANTE

Lin	Pomme de terre	Mais	Betterave	Colza	Légumineuse (pois, féverole...)	Légume
Pas d'effet	Pas d'effet	Pas d'effet	Pas d'effet sauf si présence de nématodes du collee	Pas d'effet sauf si présence de sclérotés	Pas d'effet sauf si présence de sclérotés	Pas d'effet sauf si présence de sclérotés

REMARQUES

/